


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS


**DĖL LIGŲ DIAGNOSTIKOS BEI AMBULATORINIO GYDYSMO,
KOMPENSUOJAMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO
FONDO BIUDŽETO, METODIKŲ PATVIRTINIMO (ištrauka)**

2002 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 422
Vilnius

**NEUROLEPTIKŲ ŠALUTINIS POVEIKIS
VĖLYVOSIOS DISKINEZIJOS GYDYSMAS**



NEUROLEPTIKŲ PAŠALINIS POVEIKIS ŪMINIAI EKSTRAPIRAMIDINIAI SIMPTOMAI



- RIZIKOS VEIKSNIAI (parkinsonizmas):**
- jaunas ir vyresnis amžius
 - stiprus antipsichoziško poveikio neuroleptikai
 - greitas dozēs padidinimas
 - staigus anticholinerginių vaistų vartojimo
 - nutraukimas neuroleptikų skyrimas sergantiems ne šizofrenija

NEUROLEPTIKO DOZĒS KOREKCIA

- * sumažinti dozē arba skirti silpniesnio antipsichoziško poveikio neuroleptikus arba lėčiau didinti neuroleptikų dozē

RIZIKOS VEIKSNIAI (akatizijos, distonijos):

- jaunas amžius
- didelė NL pradinė dozē
- greitas dozēs padidinimas
- stiprus antipsichoziško poveikio neuroleptikai