

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS  
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO  
IR MOKSLO MINISTRO ĮSAKYMAS

## DĖL NEIĞALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2005 m. kovo 23 d. Nr. V-188/A1-84/ISAK-487  
Vilnius

### NEIĞALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠAS (ištrauka)

Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų  
ir tvarkos aprašo priedas

#### NEIĞALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJAI (ištraukos)

##### VIII. NERVŲ SISTEMOS LIGOS IR BŪKLĖS

###### **22. Sunkaus neįgalumo lygis:**

22.1. judėjimo, koordinacijos, kalbos funkcijų, bulbariniai, dubens organų ir kiti sutrikimai:

22.1.1. vaikams, vyresniems kaip 5 m. amžiaus, kai Barthelio indeksas – iki 40 balų;

22.1.2. vaikams iki 5 m. amžiaus, kai vaiko raidos koeficientas, nustatant DISC metodika, bent trijose raidos srityse ne didesnis kaip 30%;

22.2. epilepsija (jeigu įrodytas smegenų pakenkimas ir pacientas gydomas pagal Lietuvoje patvirtintą metodiką, vertinant ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo gydymo pradžios), kai yra:

22.2.1. generalizuotų toninių-kloninių traukulių ar kitų priepuolių su kritimu, ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį;

22.2.2. sudėtingųjų ar paprastųjų židinių priepuolių kasdien;

22.2.3. sudėtingųjų ar paprastųjų židinių priepuolių kas savaitę, jei nustatyta ir pažintinių ir/ar elgesio sutrikimų, sutrikdančių socialinę adaptaciją.

###### **23. Vidutinio neįgalumo lygis:**

23.1. judėjimo, koordinacijos, kalbos funkcijų, bulbariniai, dubens organų ir kiti sutrikimai:

23.1.1. vyresniems kaip 5 m. amžiaus vaikams, kai Barthelio indeksas – 40–80 balų;

23.1.2. vaikams iki 5 m. amžiaus, kai vaiko raidos koeficientas, nustatant DISC metodika, bent trijose raidos srityse 31–50%;

23.2. epilepsija (jeigu įrodytas smegenų pakenkimas ir pacientas gydomas pagal Lietuvoje patvirtintą metodiką, vertinant ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo gydymo pradžios) kai yra:

23.2.1. generalizuoti toniniai-kloniniai traukuliai su nukritimu nuo 1 karto per du mėnesius iki 3 kartų per mėnesį;

23.2.2. sudėtingieji ar paprastieji židiniai priepuliai kas keletą dienų.

###### **24. Lengvo neįgalumo lygis:**

24.1. judėjimo, koordinacijos, kalbos funkcijų, bulbariniai sutrikimai:

24.1.1. vaikams, vyresniems kaip 5 m. amžiaus, kai Barthelio indeksas – daugiau kaip 80 balų;

24.1.2. vaikams iki 5 m. amžiaus, kai vaiko raidos koeficientas, nustatant DISC metodika, bent dviejose raidos srityse 51–80%;

24.2. epilepsija (jeigu įrodytas smegenų pakenkimas ir pacientas gydomas pagal Lietuvoje patvirtintą metodiką, vertinant ne anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo gydymo pradžios), kai yra retų (kas keletą mėnesių) generalizuotų toninių-kloninių traukulių arba lengvų (kas keletą savaitių) židinių priepuolių ir elgesio ar pažintinių sutrikimų, sutrikdančių socialinę adaptaciją.

## XI. PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI

### 30. Sunkaus neišgalumo lygis:

- 30.1. sunkus ar gilus protinis atsilikimas;
- 30.2. specifiniai mišrūs ar įvairiapusiai raidos sutrikimai (sunki forma);
- 30.3. psichozės būsenos, užsitęsusios ilgiau kaip 6 mėn.

### 31. Vidutinio neišgalumo lygis:

- 31.1. vidutinis protinis atsilikimas;
- 31.2. specifiniai mišrūs ar įvairiapusiai raidos sutrikimai (vidutinio sunkumo forma);
- 31.3. įgyta afazija su epilepsija (Landau-Kleffnerio sindromas);
- 31.4. subkompensacijos stadijos schizofrenija, atspari gydymui ir užsitęsusi ilgiau kaip 6 mėn.;
- 31.5. subkompensacijos stadijos schizotipinis sutrikimas, atsparus gydymui ir užsitęsęs ilgiau kaip 6 mėn.;
- 31.6. subkompensacijos stadijos schizoafektiniai sutrikimai, atsparūs gydymui ir užsitęsę ilgiau kaip 6 mėn.;
- 31.7. subkompensacijos stadijos nuotaikos (afektiniai) sutrikimai, atsparūs gydymui ir užsitęsę ilgiau kaip 12 mėn.;
- 31.8. sunkios formos nervinė anoreksija.

### 32. Lengvo neišgalumo lygis:

32.1. lengvas protinis atsilikimas, esant bent vienam iš raidos, psichikos ir elgesio sutrikimų, nurodytų 32.1.1–32.1.8 punktuose:

- 32.1.1. specifiniai tarimo ir kalbos sutrikimai;
- 32.1.2. specifiniai mokymosi sugebėjimų raidos sutrikimai;
- 32.1.3. specifinis judesių raidos sutrikimas;
- 32.1.4. specifiniai mišrūs raidos sutrikimai;
- 32.1.5. įvairiapusiai raidos sutrikimai;
- 32.1.6. hiperkineziniai sutrikimai;
- 32.1.7. mišrūs elgesio ir emocijų sutrikimai;
- 32.1.8. emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje;
- 32.2. specifiniai mišrūs ar įvairiapusiai raidos sutrikimai (lengva forma);
- 32.3. hiperkinezinis elgesio sutrikimas, kai kartu yra bent vienas emocijų ar nuotaikos sutrikimas;
- 32.4. depresinis elgesio sutrikimas, atsparus gydymui ir užsitęsęs ilgiau kaip 6 mėn.;
- 32.5. emocijų sutrikimai, prasidedantys vaikystėje, atsparūs gydymui ir užsitęsę ilgiau kaip 12 mėn.;
- 32.6. kombinuoti balso ir daugybiniai judesių tikai (de la Tourette'o sindromas), atsparūs gydymui ir užsitęsę ilgiau kaip 12 mėn.;
- 32.7. neorganinė enkoprezė, atspari gydymui ir užsitęsusi ilgiau kaip 12 mėn.;
- 32.8. vidutinio sunkumo nervinė anoreksija, atspari gydymui ir užsitęsusi ilgiau kaip 12 mėn.;
- 32.9. obsesinis-kompulsinis sutrikimas, atsparus gydymui ir užsitęsęs ilgiau kaip 12 mėn.;
- 32.10. potrauminio streso sutrikimas, atsparus gydymui ir užsitęsęs ilgiau kaip 12 mėn.;
- 32.11. nuotaikos (afektiniai) sutrikimai, atsparūs gydymui ir užsitęsę ilgiau kaip 12 mėn.;
- 32.12. schizofrenija, schizotipinis ir kliesesiniai sutrikimai, atsparūs gydymui ir užsitęsę ilgiau kaip 12 mėn.;
- 32.13. organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai, atsparūs gydymui ir užsitęsę ilgiau kaip 12 mėn.